

PERSKINDOL Active Classic Gél 100 ml

Használati utasítás

Mi a Perskindol Active Classic Gél és mikor kell használni?

A Perskindol Active Classic Gél mentolt és illóolajokat tartalmazó, hűsítő gél.

A Perskindol Active Classic Gél alkalmazásakor kettős hatás lép fel: biztosítja az azonnali hűsítő és nyugtató hatást, míg a bőrbe masszírozva segíti a vérkeringés serkentését és az izmok ellazulását.

A Perskindol Active Classic Gél hűsítő tulajdonságai révén különösen ajánlott:

- izomfájdalom és enyhe poszt-traumatikus fájdalmak enyhítésére, illetve csillapítására,
- ízületi fájdalmak enyhítésére,
- sportolás előtt és alatt bedörzsölve, illetve masszírozva serkenti a vérkeringést és az izmok ellazulását, elősegítve az izomfájdalmak és görcsök kialakulásának megelőzését;
- sportolás után hűsíti, ellazítja és pihenteti az izmokat.

Mik Perskindol Active Classic Gél összetevői?

Összetevők: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Isopropyl Alcohol, Carbomer, Menthol, Pinus Sylvestris Oil, Tromethamine, Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Gaultheria Procumbens Leaf Oil (metil-szalicilátot tartalmaz), Ethyl Acetate, Citrus Bergamia Oil, Citrus Limon Peel Oil, Terpeneol, Terpeneol Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Lavandula Angustifolia, Limonene, Linalool, Citral, Geraniol, Citronellol.

Nem tartalmaz parabéneket.

Hogyan kell használni a Perskindol Active Classic Gél-t?

Felnőtteknek és gyermekeknek 5 éves kortól: vékony rétegben dörzsölje be naponta többször, igény szerint, az érintett területeket.

Fontos információk

A Perskindol Active Classic Gél előírászerűen alkalmazva nem hagy zsíros nyomokat a bőrön, így alkalmazásakor a kéz, valamint a ruhák tiszták maradnak.

Ne használja a Perskindol Active Classic Gél-t, ha allergiás vagy túlérzékeny a szalicilátokra vagy a készítmény bármely összetevőjére.

Ne alkalmazza a Gél nyílt sebekre, vagy a szem környékén. Amennyiben a készítmény mégis a szembe kerülne, alaposan mossa ki a szemét vízzel.

Ne használja kötés alatt vagy lefedett területeken.

21 nap folyamatos használat után ajánlott a készítmény használatát 3 napig szüneteltetni.

A készítmény használata 5 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott. A Gél gyermekektől elzárva kell tartani.

Elővigyázatosságból ne használja a készítményt terhesség vagy szoptatás alatt.

Hagyja abba a termék használatát, ha bármilyen nem kívánt mellékhatást tapasztal. Ha a tünetek folytatódnak, forduljon gyógyszerészéhez vagy kezelőorvosához.

Tárolás: 25°C alatt.

A tubust minden egyes használatot követően gondosan le kell zárni.

Perskindol Active Classic Gél felhasználható a csomagoláson jelzett időpontig. «EXP».

Kiszerezés: 100 ml

A termék besorolása: orvostechnikai eszköz.

A használati útmutató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2016. május

Made in Switzerland

Gyártja: VERFORA SA,

Rte de Moncor 10,

1752 Villars-sur-Glâne

Svájc

Forgalmazza (Magyarországon):

Ewopharma Hungary Kft.,

1021 Budapest, Budakeszi út 73/f.